

Recomenaciones

- *Sí se detecta un diagnóstico de chancro, siempre se debería analizar la existencia de sífilis, VIH y herpes genital.*
- *Elegir la pareja indicada: alguien que te aprecie o te dé mucho afecto, que se cuide y te cuide.*
- *El único método anti-conceptivo que previene las enfermedades de transmisión sexual es el Preservativo , usalo.*
- *-No apresurarse para tener encuentros sexuales, analizar, decidir y estar seguro, sin ningún tipo de presiones.*




Camilo Gomez Reyes

Cra 23# 152A-04
Teléfono: 318 309 2969
Correo: camiloagr21@hotmail.com

Servicio y liderazgo
con sentido humano

Chancro




Camilo Gomez Reyes

Tel.: (555) 555 55 55

Que es el Chancro?

El chancro es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria llamada *Haemophilus ducreyi*. Es una lesión genital en forma de úlcera, que empieza a mostrarse entre los 3 y 14 días después del contagio y son muy dolorosas y molestas.

Es una enfermedad que afecta en mayor medida a los hombres, las mujeres solamente son portadoras de la bacteria. La bacteria del chancro se detecta sobretodo en trabajadoras sexuales.



Síntomas

Los síntomas del chancro se evidencian como una úlcera inflamada con bordes irregulares sobre los genitales y es dolorosa. La úlcera puede variar en tamaño (de 3 milímetros a 5 centímetros).


Puede sangrar fácilmente si se golpea o se rasca. Puede presentar aumento de forma en los ganglios linfáticos de las ingles y zonas cercanas.

Síntomas en el hombre

En el hombre el chancro se puede evidenciar como una pústula (ulceras) en el interior del prepucio y del frenillo del pene, o en el pene. Y en los hombres que no evidencian circuncisión pueden aparecer fístulas y cicatrices en el prepucio a consecuencia de las lesiones.

Síntomas en la mujer

En la mujer pueden surgir 4 ó más llagas en los labios, horquilla y clítoris.



Diagnostico y Tratamiento

La exploración médica de las lesiones del chancro junto con un examen al microscopio dará el diagnóstico con alta probabilidad.

Puede confundirse con sífilis, por lo que siempre deberán practicarse exámenes de la bacteria para dar un diagnóstico correcto y de confirmación.

El chancro, se trata con antibióticos por vía oral. Siempre deberá de darse el mismo tratamiento a los compañeros sexuales, en el mismo momento y duración. Además el antibiótico debe tomarse hasta la desaparición total de las lesiones.

Los nódulos inguinales podrían ser drenados para evitar que se rompan, a pesar del tratamiento antibiótico.

Camilo Gomez Reyes

Cra 23# 152A-04

Teléfono: 318 309 2969

Correo: camiloagr21@hotmail.com