

Rhincodon typus Smith, 1828



ORDEM	ORECTOLOBIFORMES
FAMÍLIA	RHINCODONTIDAE
NOME COMUM	TUBARÃO-BALEIA, PINTADO
CATEGORIA	BRASIL (BIODIVERSITAS, 2002): VU – B1ab(i) – CITES – ANEXO II

Principais características morfológicas

Possui o corpo muito grande, sendo atualmente o maior peixe conhecido. Cabeça larga e achatada e focinho muito curto. Possui cinco fendas branquiais. Olhos bem pequenos com espiráculos logo atrás. Boca terminal larga e transversa com numerosas fileiras de pequenos dentes (cerca de 300 placas dentárias em cada maxila). Duas nadadeiras dorsais. Caudal assimétrica, lobo superior bem desenvolvido. Pedúnculo caudal com uma forte quilha dérmica que segue para frente do corpo como um sulco pronunciado até a cabeça, acima das fendas branquiais.

Dorso e flancos escuros, em tons de cinza, azul ou marrom com pintas brancas ou amareladas entre listras pálidas verticais. Estas pintas podem ser usadas para identificar cada animal e fazer uma contagem exata da população. Ventre branco ou amarelado.

Biologia

Pode chegar a 20 m de comprimento total e pesar 34 t (em média 10 a 12 m e 6 a 8 t). Vivem até 150 anos, atingindo a 1ª maturação por volta dos 30 anos, com 9 m.

Ovovivíparo, os ovos permanecem no corpo da fêmea que dá à luz cerca de 300 filhotes por ninhada. Os filhotes nascem com cerca de 40 a 60 cm de comprimento.

Alimenta-se, por sucção, de fitoplâncton, macro-algas, plâncton, krill e pequenos peixes e invertebrados engolidos inteiros. Entre fechar a boca e abrir os arcos branquiais, o plâncton é encurralado contra os dentículos dermais. Praticamente somente a água (cerca de 6 mil litros/h), passa por este coador natural. Usa o olfato para encontrar alimento.

Distribuição

Espécie circungalbal que habita os oceanos tropicais e temperados, exceto o Mediterrâneo. No Brasil, pode ocorrer em, praticamente, todo o litoral.

Apesar de pelágico, o tubarão-baleia, agrega-se, de forma sazonal, para alimentar-se em várias costas (aproximadamente 35° de latitude N e S). Espécie solitária, raramente é vista em grupos, exceto em locais com alimentação abundante.

Captura e Pesca

Capturado pela pesca artesanal e industrial na China, Taiwan, Filipinas e alguns outros países do Oriente, onde a carne é vendida fresca, congelada ou seca e salgada. O fígado é processado para óleo, como impermeabilizante de cascos de barcos, polimento de sapato e no tratamento de doenças de pele. As nadadeiras são utilizadas para sopa, a cartilagem como suplemento alimentar, pele para couro e o restante para ração animal.

Fonte: <http://www.sxc.hu/photo/581791>

<http://www.fishbase.org>

<http://www.flmnh.ufl.edu/fish/education/sharkkey/whaleshark.html>

MMA (2008). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Biodiversidade 19 (2): 907p.