

CORONAVÍRUS



O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, semelhantes à gripe;

O novo coronavírus, que surgiu em dezembro de 2019 na China, provoca a doença denominada de COVID-19;

O número de pessoas infectadas por esse vírus tem aumentado em todo o mundo, assim como o número de mortes provocadas pela doença, o que torna necessário que cada um siga as medidas de prevenção, higienização e isolamento social;

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



PERÍODO DE INCUBAÇÃO: É o tempo que vai do momento em que a pessoa entrou em contato com o vírus até surgirem os primeiros sintomas;

**PERÍODO DE INCUBAÇÃO DO CORONAVÍRUS:
5 DIAS A 2 SEMANAS**

MODO DE TRANSMISSÃO: Como uma pessoa pode adquirir a doença?

- Objetos ou Superfícies Contaminados;
- Gotas de Saliva;
- Aperto de Mão;
- Espirro;

SINTOMAS DA INFECÇÃO EM CRIANÇAS



TOSSE FEBRE DIARREIA VÔMITO

NARIZ ENTUPIDO DOR NA GARGANTA

**LEMBRE-SE QUE MUITAS VEZES A CRIANÇA
PODE NÃO APRESENTAR SINTOMAS!**

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO A RESPEITO DA INFECÇÃO PELO SARS- COV-2 (COVID-19) EM RECÉM- NASCIDOS E CRIANÇAS

ORIENTAÇÃO:

DRA. ADRIANA TAVORA A. TAVEIRA

Gastroenterologia e Hepatologia
Pediátrica

Professora Adjunta de Pediatria -
Universidade Federal do Amazonas

PRODUÇÃO:

VIVIANE SANTOS FERREIRA

Acadêmica do 8º período de Medicina -
Universidade Federal do Amazonas



CUIDADOS COM RECÉM- NASCIDOS E CRIANÇAS

**. CORONAVÍRUS .
(COVID-19)**



SINAIS DE ALERTA



GERAIS

- Dificuldade de respirar;
- Febre ou vômito persistente;
- Criança não parece estar bem;
- Recusa a se alimentar/ amamentar
- Episódio de convulsão
- Criança prostrada ou inconsciente;
- Presença de gemido constante;

SINAIS DE GRAVIDADE EM CRIANÇA COM TOSSE:

- Respiração rápida;
- Falta de ar;
- Ruídos no peito;
- Afundamento da pele das costas ao respirar;

SINAIS DE GRAVIDADE EM CRIANÇA COM DESNUTRIÇÃO OU ANEMIA:

- Olhos fundos;
- Boca seca, muita sede;
- Sonolência;

SINAIS DE GRAVIDADE EM CRIANÇAS COM DIARREIA

- Respiração rápida;
- Falta de ar;
- Ruídos no peito;
- Afundamento da pele das costas ao respirar;

SINAIS DE PERIGO EM CRIANÇAS COM FEBRE

- Febre prolongada por 5 dias, sem melhora;
- Manifestações de sangramento (pontos vermelhos na pele, presença de sangue na gengiva, nariz, fezes ou vômito;
- Manchas na pele, acompanhado ou não de tosse e vermelhão nos olhos



NA PRESENÇA DE QUALQUER SINAL DE ALERTA A CRIANÇA DEVE SER LEVADA IMEDIATAMENTE AO HOSPITAL

COMO PROTEGER RECÉM- NASCIDOS E CRIANÇAS?



HIGIENIZAR AS MÃOS PREFERENCIALMENTE COM ÁGUA E SABÃO. QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL. UTILIZE ÁLCOOL A 70%

MANTER AS SUPERFÍCIES DA CASA LIMPAS DIARIAMENTE

LAVAR OBJETOS E BRINQUEDOS

MANTER OS AMBIENTES BEM VENTILADOS, COM AS JANELAS ABERTAS

EVITAR O CONTATO COM AS PESSOAS QUE APRESENTEM ALGUM DOS SINTOMAS

PERMANECER EM CASA O MÁXIMO POSSÍVEL

ENSINAR A CRIANÇA A SEMPRE LAVAR AS MÃOS QUANDO TOSSIR OU ESPIRRAR

ORIENTAR A CRIANÇA A EVITAR TOCAR O ROSTO, PRINCIPALMENTE A BOCA

EVITAR LOCAIS PÚBLICOS, VIAGENS E CONTATO COM OUTRAS CRIANÇAS

IMUNIZAÇÃO



O CALENDÁRIO VACINAL DEVE SER MANTIDO SEMPRE ATUALIZADO!

CRIANÇAS E O RISCO DE ADOECEREM



Crianças são tao propensas a se infectarem quanto os adultos. A diferença é que elas apresentam menos sintomas e também um menor risco desenvolver a doença de forma de grave.

Mesmo assim, é importante manter as medidas de prevenção para que elas não transmitam a doença para outras pessoas, principalmente aquelas que vivem na mesma casa.

CUIDADOS COM A AMAMENTAÇÃO



Ainda não se sabe certamente se a mãe que esteja com COVID- 19 pode transmitir o vírus para o filho através do leite materno. No entanto, algumas medidas devem ser seguidas para evitar a infecção do recém-

LAVAR BEM AS MÃOS ANTES DE TOCAR O BEBÊ OU OBJETOS, COMO MAMADEIRA

MÃES COM SUSPEITA DE COVID-19: USAR MÁSCARA FACIAL NO MOMENTO DA AMAMENTAÇÃO



NÃO É RECOMENDADO QUE SE SUSPENDA O ALEITAMENTO MATERNO

ESSAS MEDIDAS NOS AJUDAM A PREVENIR CONTRA O CORONAVÍRUS, MAS TAMBÉM NOS PROTEGEM CONTRA O MEDO E AS FALSAS NOTÍCIAS!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Brasil. Ministério da Saúde. Manual Aidpi Criança: 2 meses a 5 anos [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017

SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Aleitamento Materno. O aleitamento materno nos tempos de COVID-19. Março, 2020.

SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento científico de neonatologia. Prevenção e abordagem da infecção por COVID- 19 em mães e Recém- nascidos, em Hospitais- Maternidades. Março, 2020.

SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento científico de neonatologia. Recomendações para Cuidados e assistência ao Recém- Nascido com suspeita ou diagnóstico de COVID - 19. Março, 2020.

SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Grupo Executivo Nacional de Reanimação Neonatal. Recomendações para assistência ao Recém- Nascido na sala de parto de mãe com COVID-19 suspeita ou confirmada. Março, 2020.

SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento científico de cardiologia da sociedade Brasileira de Pediatria. A criança nos tempos de COVID- 19: posicionamento oficial conjunto. Março, 2020.