

TIPOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN LOCALIZACIÓN ANATÓMICA

Tuberculosis Pulmonar



1

Es **contagiosa**, se transmite a través de gotas menores a 5 micras cuando una persona con esta enfermedad sin tratamiento tose o estornuda.⁽¹⁾

2

La manifestación clínica más común es la **tos** con o sin expectoración **por más de 15 días**.⁽³⁾

3

Se puede diagnosticar con la baciloscopia, pruebas moleculares y Rayos X de Tórax.⁽³⁾

4

El **tratamiento** para la tuberculosis sensible es **estandarizado y gratuito**.⁽³⁾

5

La Tuberculosis Pulmonar y laríngea **exige el aislamiento por aerosol**.

La Tuberculosis Pulmonar es la forma **más frecuente** de la enfermedad, representando más del

70% de los casos identificados.⁽²⁾

La **captación oportuna de sintomáticos respiratorios**, es una de las medidas más efectivas para el control de la tuberculosis.

Tuberculosis Extrapulmonar

1

Puede afectar **cualquier parte del cuerpo**, las más comunes son la meníngea, renal y osteomuscular.⁽³⁾

2


Su diagnóstico se realiza con **cultivo de muestra del órgano o tejido afectado y prueba molecular**.⁽³⁾

3

El esquema de tratamiento es **estandarizado y depende** del órgano afectado.⁽³⁾

4

Los pacientes con coinfección VIH, inmunosuprimidos y niños tienden a desarrollar más la Tuberculosis Extrapulmonar.



La Tuberculosis Extrapulmonar representa

menos de 30% de los casos.⁽²⁾

Los **signos y síntomas** dependen de la parte del cuerpo afectado y del estado del sistema inmune.



Referencia bibliográfica:

1. World Health Organization (WHO). Global Tuberculosis Report 2019. [Internet]. 2019. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329368/9789241565714-eng.pdf?ua=1>
2. Instituto Nacional de Salud. Informe del evento: Tuberculosis. 2019 [Internet]. Colombia; 2019 p. 1-39. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/TUBERCULOSIS%20SEMESTRE%20I%202019.pdf>
3. Ministerios de Salud y Protección Social. Resolución 227 de 2020 [Internet]. 227 2020 p. 1-175. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20227%20de%202020.pdf