

### 3.1- Noção Intuitiva

A idéia de limite é fácil de ser captada intuitivamente. Por exemplo, imagine uma placa metálica quadrada que se expande uniformemente porque está sendo aquecida. Se  $x$  é o comprimento do lado, a área da placa é dada por  $A = x^2$ . Evidentemente, quanto mais  $x$  se avizinha de 3, a área  $A$  tende a 9. Expressamos isto dizendo que quando  $x$  se aproxima de 3,  $x^2$  se aproxima de 9 como um limite. Simbolicamente escrevemos:

$$\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$$

onde a notação " $x \rightarrow 3$ " indica  $x$  tende a 3 e "lim" significa o limite de.

Generalizando, se  $f$  é uma função e  $a$  é um número, entende-se a notação

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

como "o limite de  $f(x)$  quando  $x$  tende a  $a$  é  $L$ ", isto é,  $f(x)$  se aproxima do número  $L$  quando  $x$  tende a  $a$ .


**Exemplo 1:** Seja  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ ,  $Df = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 2\}$ .

$$\text{Se } x \neq 2 \rightarrow f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)} = x + 2$$

$$\therefore \text{Se } x \neq 2 \rightarrow f(x) = x + 2$$

$x$	$f(x)$
1	3
1,5	3,5
1,9	3,9
1,99	3,99


$x$	$f(x)$
3	5
2,5	4,5
2,1	4,1
2,01	4,01



Note que para todo  $x \in V(2, \delta) \rightarrow f(x) \in V(4, \varepsilon)$  podemos dizer que o limite de  $f(x)$  quando  $x$  tende para 2 é igual a 4 e podemos escrever:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

De modo geral se  $y = f(x)$  definida em um domínio  $D$  do qual  $a$  é ponto de acumulação.



Na determinação do limite de  $f(x)$ , quando  $x$  tende para  $a$ , não interessa como  $f$  está definido em  $a$  (nem mesmo se  $f$  está realmente definido). A única coisa que interessa é como  $f$  está definido para valores de  $x$  na vizinhança de  $a$ . De fato podemos distinguir três casos possíveis como segue:

Suponha que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ . Então exatamente um dos três casos é válido:

**Caso 1-**  $f$  está definido em  $a$  e  $f(a) = L$ .

**Caso 2-**  $f$  não está definido em  $a$ .

**Caso 3-**  $f$  está definido em  $a$  e  $f(a) \neq L$ .

### 3.2- Definição Formal de Limite

Seja  $f(x)$  definida em um domínio  $D$  do qual  $a$  é ponto de acumulação dizemos que  $f(x)$  tem limite  $L$  quando  $x$  tende para  $a$ , e se indica por:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ se e somente se para todo } \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |f(x) - L| < \varepsilon \text{ sempre que } 0 < |x - a| < \delta$$

A função  $f$  é definida em um intervalo aberto qualquer que contenha  $a$ , excluindo o valor de  $a$

Exemplos:

Usando a definição de limite, mostre que:

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} (5x + 4) = 9$$

$$|(5x + 4) - 9| < \varepsilon$$

$$|5x - 5| < \varepsilon$$

$$|5 \cdot (x - 1)| < \varepsilon$$

$$|5| \cdot |x - 1| < \varepsilon$$

$$5 \cdot |x - 1| < \varepsilon$$

$$|x - 1| < \frac{\varepsilon}{5}$$

$$|x - 1| < \delta$$

$$\delta = \frac{\varepsilon}{5}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -2} (3x + 1) = -5$$

$$|3x + 1 - (-5)| < \varepsilon$$

$$|3x + 1 + 5| < \varepsilon$$

$$|3 \cdot (x + 2)| < \varepsilon$$

$$|3| \cdot |x + 2| < \varepsilon$$

$$|x + 2| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$|x - (-2)| < \delta$$

$$|x + 2| < \delta$$

$$\delta = \frac{\varepsilon}{3}$$

$\Rightarrow$  Se  $f(x) = x \rightarrow y = x$  (Função Identidade)

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow a} x = a} \quad \underline{\text{P1}}$$

$$|x - a| < \varepsilon \rightarrow |x - a| < \delta$$

$$\varepsilon = \delta$$

$\Rightarrow$  Se  $f(x) = k \rightarrow y = k$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow a} k = k} \quad \underline{\text{P2}}$$

#### 3.2.1- Propriedades dos Limites de Funções

Até agora, temos estimado os limites das funções por intuição, com auxílio do gráfico da função, com o uso de álgebra elementar, ou pelo uso direto da definição de limites em termos de  $\varepsilon$  e  $\delta$ . Na prática, entretanto, os limites são usualmente achados pelo uso de certas propriedades, que vamos estabelecer agora:

#### Propriedades Básicas de Limites

Suponha que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  e  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  e  $k$  é uma constante

$$1) \lim_{x \rightarrow a} x = a$$

- 2)  $\lim_{x \rightarrow a} k = k$
- 3)  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \pm M$
- 4)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \cdot M$
- 5)  $\lim_{x \rightarrow a} c \cdot f(x) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$  onde  $c$  é uma constante qualquer
- 6)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M} \quad \left( \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0 \right)$
- 7)  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n = L^n$  ( $n$  é um inteiro positivo qualquer)
- 8)  $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \sqrt[n]{L}$  se  $L > 0$  e  $n$  é um inteiro positivo, ou se  $L < 0$  e  $n$  é um inteiro positivo ímpar
- 9)  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^{g(x)} = \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = L^M$
- 10)  $\lim_{x \rightarrow a} \log_b f(x) = \log_b \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] = \log_b L$
- 11)  $\lim_{x \rightarrow a} \sin(f(x)) = \sin \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] = \sin L$
- 12)  $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \left| \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right| = |L|$
- 13) Se  $h$  é uma função tal que  $h(x) = f(x)$  é válido para todos os valores de  $x$  pertencentes a algum intervalo ao redor de  $a$ , excluindo o valor de  $x = a$ , então  

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Observação: Demonstração das propriedades em sala de aula.

### Exercícios:

- 1)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{5x - 1}$   

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^2 + 2x}}{\lim_{x \rightarrow 2} 5x - 1} = \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 2x}}{\lim_{x \rightarrow 2} 5x - \lim_{x \rightarrow 2} 1} = \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 2x}}{5 \lim_{x \rightarrow 2} x - 1} = \frac{\sqrt{2^2 + 2 \cdot 2}}{5 \cdot 2 - 1} = \frac{\sqrt{4 + 4}}{10 - 1} = \frac{\sqrt{8}}{9}$$
- 2) Seja  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$  e  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$ , ache cada limite
  - a-  $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x) + g(x)]$
  - b-  $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x) - g(x)]$
  - c-  $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{f(x) \cdot g(x)}$
- 3) Avalie cada limite e indique quais das propriedades de 1 a 13
  - a-  $\lim_{x \rightarrow -1} [5 - 3x - x^2]$

$$b- \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 2x}$$

$$c- \lim_{t \rightarrow 1/2} \frac{t^2 + 1}{1 + \sqrt{2t + 8}}$$


$$d- \lim_{x \rightarrow 5/2} \frac{4x^2 - 25}{2x - 5}$$

$$e- \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1/\sqrt{x}) - 1}{1 - x}$$

### 3.3- Limites Laterais

#### Limite à direita:

Seja  $f$  uma função definida em um intervalo  $(a, c)$  e  $L$  um número real, a afirmação  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ , significa que para todo  $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , tal que  $0 < x - a < \delta \rightarrow a < x < a + \delta \rightarrow$



#### Limite à esquerda:

Seja  $f$  uma função definida no intervalo  $(c, a)$  e  $L$  um número real, a afirmação  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ , significa que para todo  $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |f(x) - L| < \varepsilon$  sempre que  $-\delta < x - a < 0 \rightarrow a - \delta < x < a$



#### 3.3.1- Teorema

O limite  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe e é igual a  $L$  se e somente se ambos os limites laterais  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  existem e tem o mesmo valor comum  $L$ .

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

#### Exemplos:

$$1) f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{se } x \geq 1 \\ x^2 & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = ? \rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = (2 \cdot 1 - 1) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = (1)^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \text{são iguais} \therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

$$2) f(x) = \begin{cases} 3x + 1 & \text{se } x > 2 \\ -2x + 4 & \text{se } x \leq 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = ? \rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 7 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0 \end{cases} \rightarrow \text{são diferentes} \therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \text{não existe}$$

#### Exercícios:

1- Nos problemas de a até c trace o gráfico das funções dadas, ache os limites laterais das funções dadas quando  $x$  tende para a pela direita e pela esquerda e determine o limite da função quando  $x$  tende para  $a$  (se o limite existe)

$$a) f(x) = \begin{cases} 5+x & \text{se } x \leq 3 \\ 9-x & \text{se } x > 3 \end{cases}; a = 3$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 2-x & \text{se } x > 1 \\ x^2 & \text{se } x \leq 1 \end{cases}; a = 1$$

$$c) S(x) = 5 + |6x - 3|, a = \frac{1}{2}$$

2- Explique porque freqüentemente achamos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  apenas pelo cálculo do valor de  $f$  no ponto  $a$ . Dê um exemplo para mostrar que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$  pode não ocorrer

### 3.4- Continuidade das Funções

Mencionamos anteriormente que quando  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ , a função  $f$  é contínua em  $a$ . De agora em diante consideraremos isto uma definição oficial.





**Definição 1:** Dizemos que a função  $f$  é contínua em um número  $a$  se e somente se as seguintes condições forem válidas.

Condições:

$$\exists f(a)$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$



$\exists f(a)$  OK!

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \cancel{\neq} \rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = b \\ \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = c \end{cases} \therefore \neq$$

$\exists f(a)$  OK!

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ OK!}$$
$$f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

### Exercícios:

1) Verificar se  $f(x) = \begin{cases} 3 - x^2 & \text{se } x \leq 1 \\ 1 + x^2 & \text{se } x > 1 \end{cases}$  é contínua para  $x = 1$  :

i)  $f(1) = 2$  OK!

ii)  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = ?$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3 - 1 = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + 1 = 2 \end{cases}$$

São iguais  $\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$  OK!

iii)  $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  OK!

Resposta: É contínua

2) Verificar se  $f(x) = x^2 - 3$  é contínua para  $x = 0$  :

$$f(0) = -3 \text{ OK!}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -3 \text{ OK!}$$

$$f(0) \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

Resposta: Como as condições 1 e 3 da definição 1 foram satisfeitas, concluímos que  $f$  é contínua em 0

3) Verifique se a função  $f$  definida por  $f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 + 3x + 1}{x + 1} & \text{se } x \neq -1 \\ 3 & \text{se } x = -1 \end{cases}$  é contínua para o número -1

Observações Importantes: Se os dois limites laterais  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  existem e têm o mesmo valor, é claro que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe e que todos os três limites têm o mesmo valor. Se  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe, os dois limites laterais  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  existem e todos os três limites são iguais. Consequentemente, se os dois limites  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  existem, mas têm valores diferentes, então  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  não pode existir.

### Exercícios

1- Em cada exemplo, (a) trace o gráfico da função, (b) ache os limites laterais da função quando  $x \rightarrow a^-$  e quando  $x \rightarrow a^+$ , (c) determine o limite da função quando  $x \rightarrow a$  (se ele existe) e (d) diga se a função é contínua no valor  $a$

$$1- f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x < 3 \\ 10 - x & \text{se } x \geq 3 \end{cases} ; a = 3$$

$$2- f(x) = \begin{cases} |x - 2| & \text{se } x \neq 2 \\ 1 & \text{se } x = 2 \end{cases} ; a = 2$$

$$3- f(x) = \begin{cases} 3 - x^2 & \text{se } x \leq 1 \\ 1 + x^2 & \text{se } x > 1 \end{cases} ; a = 1$$

### 3.4.1- Propriedades das Funções Contínuas

Suponha que  $f$  e  $g$  sejam duas funções contínuas no número  $a$ . Então tanto  $f(a)$  como  $g(a)$  são definidas, e consequentemente  $(f+g)(a)=f(a)+g(a)$  é definida.

- 1- Se  $f$  e  $g$  são contínuas em  $a$ , então  $f+g$ ,  $f-g$  e  $f.g$  também o são.
- 2- Se  $f$  e  $g$  são contínuas em  $a$  e  $g(a) \neq 0$ , então  $f/g$  é contínua em  $a$ .
- 3- Se  $g$  é contínua em  $a$  e  $f$  é contínua em  $g(a)$ , então  $f \circ g$  é contínua em  $a$ .
- 4- Uma função polinomial é contínua em todos os números.
- 5- Uma função racional é contínua em todo número no qual está definida.

#### Exercícios

1- Use as propriedades básicas de função contínua para determinar em quais números as funções dadas são contínuas. Trace o gráfico das funções.


$$1- f(x) = x + |x|$$

$$2- f(x) = |x^2|$$

$$3- f(x) = \frac{2}{x-1}$$

### 3.4.2- Continuidade em um intervalo

Dizer que uma função  $f$  é contínua em um intervalo aberto  $I$  significa, por definição, que  $f$  é contínua em todos os números no intervalo  $I$ . Por exemplo, a função  $f(x) = \sqrt{9-x^2}$  é contínua no intervalo aberto  $(-3,3)$



Da mesma forma, dizer que uma função  $f$  é contínua em um intervalo fechado  $[a,b]$  significa, por definição que  $f$  é contínua no intervalo aberto  $(a,b)$  e que satisfaz as seguintes condições de continuidade nos pontos finais  $a$  e  $b$ :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \text{ e } \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

Por exemplo, a função  $f(x) = \sqrt{9-x^2}$  é contínua no intervalo fechado  $[-3,3]$

### 3.5- Limite de Função Composta

Sejam  $f$  e  $g$  duas funções tais que  $\text{Im} f \subset \text{D}_g$ . Nosso objetivo é estudar o limite

$$\lim_{x \rightarrow p} g(f(x))$$

Supondo que  $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = a$  é razoável esperar que

$$\lim_{x \rightarrow p} g(u) = \lim_{u \rightarrow a} g(u) \text{ sendo } u = f(x)$$

Os casos que interessarão ao curso são aqueles em que  $g$  ou é contínua em  $a$  ou não está definida em  $a$ . O quadro que apresentamos a seguir mostra como iremos trabalhar com o limite de função composta no cálculo de limites.

$\lim_{x \rightarrow p} F(x) = ?$ <p>Suponhamos que existam funções <math>g(u)</math> e <math>u=f(x)</math>, onde <math>g</math> ou é contínua em <math>a</math> ou não está definida em <math>a</math>, tais que <math>F(x)=g(u)</math> onde <math>u=f(x)</math>, <math>x \in Df</math>, <math>\lim_{x \rightarrow p} f(x) = a</math> (<math>u \rightarrow a</math> para <math>x \rightarrow p</math>) e que <math>\lim_{u \rightarrow a} g(u)</math> exista. Então</p> $\lim_{x \rightarrow p} F(x) = \lim_{u \rightarrow a} g(u)$
--

### Exercícios

1- Calcule os limites

a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x - 1}}$

b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3 - x^3)^4 - 16}{x^3 - 1}$

c)  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{x+2} - 1}{x+1}$

d)  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{3x+5} - 2}{x^2 - 1}$

2) Seja  $f$  definida em  $\mathbb{R}$ . Suponha que  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ . Calcule

a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x}$

b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2 - 1)}{x - 1}$

3) Seja  $f$  definida em  $\mathbb{R}$  e seja  $p$  um real dado. Suponha que  $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = L$  calcule

a)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h}$

b)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+3h) - f(p)}{h}$

c)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p-h) - f(p)}{h}$

### 3.6- Limite das Funções Algébricas Racionais Inteiras (Polinomiais)

$$F(x) = a_0 \cdot x^n + a_1 \cdot x^{n-1} + \dots + a_n$$

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = F(a)$$



### 3.7- Limite das Funções Racionais Fracionárias

$$F(x) = \frac{Q(x)}{g(x)}$$

$$Q(x) = a_0 \cdot x^n + a_1 \cdot x^{n-1} + \dots + a_n$$

$$g(x) = b_0 \cdot x^m + b_1 \cdot x^{m-1} + \dots + b_m$$


$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{Q(x)}{g(x)} = \frac{Q(a)}{g(a)}$$

\* Se  $Q(a) = 0$  e  $g(a) \neq 0$

$$\frac{0}{n^\circ} = 0$$

\* Se  $Q(a) \neq 0$  e  $g(a) = 0$

$$\frac{n^\circ}{0}$$



a função não está definida para  $x = a$

$$\frac{n^\circ}{0} = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \\ \text{não existe} \end{cases}$$

$$\frac{n^\circ}{0} \rightarrow \text{Calcule :}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{Q(x)}{g(x)} = \pm\infty \\ \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{Q(x)}{g(x)} = \pm\infty \end{cases} \rightarrow \text{são iguais} \therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{Q(x)}{g(x)} = \pm\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{Q(x)}{g(x)} = \pm\infty \\ \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{Q(x)}{g(x)} = \mp\infty \end{cases} \rightarrow \text{são diferentes} \therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{Q(x)}{g(x)} = \text{não existe}$$

#### Exercícios:

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5x+2}{4x^2-9} = \frac{7}{-5} = -\frac{7}{5}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{5x+2} = \frac{0}{12} = 0$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x}{x-2} = \frac{10}{0} = ?$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{5x}{x-2} = \frac{10}{0^+} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{5x}{x-2} = \frac{10}{0^-} = -\infty \end{cases} \rightarrow \neq \therefore \text{não existe}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x}{(x-2)^2} = \frac{10}{0} = ?$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{5x}{(x-2)^2} = \frac{10}{0^+} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{5x}{(x-2)^2} = \frac{10}{0^+} = +\infty \end{cases} \rightarrow = \therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x}{(x-2)^2} = +\infty$$

\*Se  $Q(x) = g(x) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{Q(x)}{g(x)} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{indeterminação} = \frac{\infty}{\infty}, \text{etc.}$$

### Exercícios:

$$\begin{aligned} 1) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} &= \frac{0}{0} \\ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)} & \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} x + 2 \\ &= 2 + 2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 4)}{(x^2 - 3x + 2)} &= \frac{0}{0} \\ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} & \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)}{(x-1)} \\ &= \frac{(2+2)}{(2-1)} \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$3) \quad \lim_{z \rightarrow -2} \frac{z^4 + 3z^3 - 4z}{z^2 + 4z + 4} = \frac{0}{0}$$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} (z+2) & -2 & 1 & 3 & 0 & -4 & 0 \\ (z-1) & 1 & 1 & 1 & -2 & 0 & \\ \hline & & 1 & 2 & 0 & & \\ & & z^2 & + & 2z & = & 0 \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} z = 0 \rightarrow z \\ z = -2 \rightarrow (z+2) \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} &= (-2-1) \cdot (-2) \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$4) \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{t^3 + 1}{t + 1} = \frac{0}{0}$$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} (t+1) & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ & & 1 & -1 & 1 & 0 & \\ \hline & & (t+1) & \cdot & (t^2 - t + 1) & & \end{array}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(t+1)(t^2 - t + 1)}{(t+1)} & \\ &= ((-1)^2 - (-1) + 1) \\ &= 3 \end{aligned}$$

### 3.8- Limite das Funções Irracionais

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x} = \frac{0}{0}$$

$$\frac{(\sqrt{x+2} - \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{x+2} + \sqrt{2})}{x \cdot (\sqrt{x+2} + \sqrt{2})} = \frac{x+2-2}{x \cdot (\sqrt{x+2} + \sqrt{2})} = \frac{x}{x \cdot (\sqrt{x+2} + \sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{x+2} + \sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+2} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

Outra maneira:

Substituição de Variável

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x} = \frac{0}{0}$$

$$\begin{cases} x+2 = t^2 \\ x = t^2 - 2 \\ x \rightarrow 0 \therefore t \rightarrow \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \sqrt{2}} \frac{t - \sqrt{2}}{t^2 - 2} \\ &= \lim_{t \rightarrow \sqrt{2}} \frac{t - \sqrt{2}}{(t + \sqrt{2})(t - \sqrt{2})} \\ &= \lim_{t \rightarrow \sqrt{2}} \frac{1}{t + \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

### 3.9- Limites Envolvendo Infinito

Definições:


- 1) Dizemos que um elemento  $c$  é finito quando  $c \in \mathbb{R}$  e dizemos que  $c$  é infinito quando  $c$  é um dos símbolos  $+\infty$  ou  $-\infty$ .

Obs.: quando valer a frase do limite para  $b$  finito ou infinito, diremos que existe o limite e indicaremos por

$\exists \lim_{x \rightarrow b} f(x) = \begin{cases} c \\ +\infty \end{cases}$ . Em caso contrário diremos que não existe o limite e escreveremos

$$\nexists \lim_{x \rightarrow b} f(x) = \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \end{array} \right\} \neq .$$

- 2) Seja  $f$  definida em um intervalo  $(c, +\infty)$ . A afirmação  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ , significa que a todo  $\varepsilon > 0$  corresponde um número positivo  $N$ , tal que  $|f(x) - L| < \varepsilon \quad \forall \quad x > N$ .
- 3) Seja  $f$  definida em uma vizinhança perfurada de  $a$ , a afirmação  $f(x)$  se torna infinita quando  $x$  tende para  $a$  que se escreve:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ , significa que para todo número positivo  $N$ , corresponde um  $\delta > 0 / f(x) > N$  sempre que  $0 < |x - a| < \delta$ .



### 3.10- Limite das Funções Algébricas Racionais Inteiras (Polinomiais)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \underbrace{a_0 x^n}_{\text{grau mais alto}} + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a_0 x^n = \begin{cases} +\infty \\ \text{ou} \\ -\infty \end{cases}$$

#### Exercícios

$$1) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (5x^3 + 4x^2 - 2x - 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^3 = -\infty$$

$$2) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (5x^2 + 3x - 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^2 = +\infty$$

### 3.11- Limite das Funções Racionais Fracionárias

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 \cdot x^n + a_1 \cdot x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 \cdot x^m + b_1 \cdot x^{m-1} + \dots + b_m}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 \cdot x^n}{b_0 \cdot x^m}$$

Se :

$$* n > m \Rightarrow +\infty \text{ ou } -\infty$$

$$* n < m \Rightarrow 0$$

$$* n = m \Rightarrow \frac{a_0}{b_0}$$

#### Exemplos:

$$1) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 + 4x - 2}{2x^2 + 6x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3}{2x^2} = -\infty$$

$$2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x - 4}{x^3 + 5x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^3} = \frac{2}{\infty} = 0$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^5 + 2x^3 - 4}{4x^5 + 4x^4 + 2x^3 - x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^5}{4x^5} = \frac{3}{2}$$

Indeterminações:

$$+\infty - (+\infty), -\infty - (-\infty), 0 \cdot \infty, \frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, 1^\infty, 0^0, \infty^0$$

### 3.12- Seqüência e Limite de Seqüência

Uma seqüência ou sucessão de números reais é uma função  $n \mapsto a_n$ , a valores reais, cujo domínio é um subconjunto de  $\mathbb{N}$ . As seqüências que vão interessar ao curso são aquelas cujo domínio contém um subconjunto do tipo  $\{n \in \mathbb{N} / n \geq q\}$  onde  $q$  é um natural fixo; só consideraremos tais seqüências.

Exemplos:

1- Seja a seqüência de termo geral  $a_n = 2^n$ . Temos

$$a_0 = 2^0, a_1 = 2^1, a_2 = 2^2, \dots$$

2- Seja a seqüência de termo geral  $s_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$  temos

$$s_1 = 1, s_2 = 1 + 2, s_3 = 1 + 2 + 3 \text{ etc.}$$

Sejam  $m \leq n$  dois naturais. O símbolo

$$\sum_{k=m}^n a_k$$

leia: somatório de  $a_k$ , para  $k$  variando de  $m$  até  $n$  e é usado para indicar a soma dos termos  $a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots, a_n$

**Definição:** Consideremos uma seqüência de termo geral  $a_n$  e seja  $a$  um número real.

Definimos

- (i)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$  Para todo  $\varepsilon > 0$ , existe um natural  $n_0$  tal que  $n > n_0 \Rightarrow a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$
- (ii)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$  Para todo  $\varepsilon > 0$ , existe um natural  $n_0$  tal que  $n > n_0 \Rightarrow a_n > \varepsilon$
- (iii)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$  Para todo  $\varepsilon > 0$ , existe um natural  $n_0$  tal que  $n > n_0 \Rightarrow a_n < -\varepsilon$

Se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ , diremos que a seqüência de termo geral  $a_n$  converge para  $a$  ou, simplesmente, que  $a_n$  converge para  $a$  e escrevemos  $a_n \rightarrow a$ . Se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ , diremos que  $a_n$  para  $+\infty$  e escrevemos  $a_n \rightarrow +\infty$ . Observamos que as definições dadas aqui são exatamente as mesmas que demos quando tratamos com limite de uma função  $f(x)$ , para  $x \rightarrow +\infty$ ; deste modo, tudo aquilo que dissemos sobre os limites da forma  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x)$  aplica-se aqui.

#### Exercícios

1- Calcule os limites

a-  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+3}{n+1}$

b-  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 1}{3^n + 2}$

c-  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k$

2- Supondo que  $0 < b < 1$ , calcule  $\lim_{n \rightarrow +\infty} b^n$

3- Suponha  $a > 1$ . Mostre que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$

4- Considere a sequência de termo geral  $s_n = \sum_{k=0}^n t^k$ ,  $t \neq 0$  e  $t \neq 1$ . Verifique que  $s_n = \frac{1-t^{n+1}}{1-t}$

### 3.13- Limite das Funções Transcendentais

Exemplos:

Exemplos:

1)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln(x^2 + 4) - \ln(2x - 1)) = \infty - \infty \rightarrow \text{indeterminação}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \ln \frac{x^2 + 4}{2x - 1} \right)$$


$$= \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4}{2x - 1}$$

$$= \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2x}$$

$$= \infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{indeterminação}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1 \rightarrow \text{lim. notável}$$

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} =$$


### 3.14- Limites Notáveis

1)  $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$  (1° Limite Fundamental)

**Demonstração:**

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{sent}{t}$$

$$f(t) = \frac{sent}{t}$$

$$t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$S_{OQP} = \frac{t}{2}$$

$$S_{\Delta OQP} = \frac{\text{sen } t}{2}$$


$$S_{\Delta OQQ'} = \frac{\text{sen } t}{2 \cdot \cos t}$$

$$*\frac{1}{2} \frac{\text{sent}}{\cos t} > \frac{t}{2} > \frac{\text{sent}}{2} \quad x(2)$$

$$\frac{\sin t}{\cos t} > t > \sin t \quad \div (\sin t)$$

$$\frac{l}{\cos t} > \frac{t}{\sin t} > l \quad (\text{inverte-se e troca-se os sinais})$$

$$1 > \frac{\sin t}{t} > \cos t$$



$$* \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} 1 > \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} > \lim_{t \rightarrow 0} \cos t$$

$$1 > \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} > 1$$

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1}$$

Exemplo:

$$\begin{aligned} 1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \cdot \sin 5x}{5x} \\ = 5 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\sin 5x}{5x}}_{=1} \\ = 5 \cdot 1 = 5 \end{aligned}$$

$$2) \quad \boxed{\lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{1/u} = e} \quad (2^\circ \text{ Limite Fundamental})$$

Exemplos:

$$1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$$

$$2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+\tan x)^{1/\tan x} = e$$

$$\begin{aligned} 3) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{2/x} \\ = \left[ \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} \right]^2 \\ = e^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{k}{x}} = e^k}$$

$$4) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{2x}} = e^{\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned} 5) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}} \\ 2x = y \Rightarrow x \rightarrow 0 \Rightarrow y \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$x = \frac{y}{2}$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{2}{y}} = e^2$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} (1+kx)^{\frac{1}{x}} = e^k}$$

$$3) \quad \boxed{\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{u} = 1}$$

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{\cos u} \cdot \frac{1}{u} =$$

$$\lim_{u \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\sin u}{u}}_{=1} \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \underbrace{\frac{1}{\cos u}}_{=1} = 1$$

$$4) \quad \boxed{\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u = e}$$

\* Substituir:  $\frac{1}{u} = y \Rightarrow u \rightarrow \infty \Rightarrow y \rightarrow 0$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{y}} = e^k}$$

Exemplos:

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^{ku} = e^k$$

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{u}\right)^u = e^k$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{5x} = e^5$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x = e^3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{5x} = e^{15}$$

$$5) \quad \boxed{\lim_{u \rightarrow 0} \frac{a^u - 1}{u} = \ln a}$$

\* Substituir:  $a^u - 1 = y \therefore a^u = y + 1$

$$u \rightarrow 0 \Rightarrow y \rightarrow 0 \quad u = \log_a(y+1)$$

$$* \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log_a(1+y)} = \left[ \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+y)}{y} \right]^{-1} = \left[ \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} \cdot \log_a(1+y) \right]$$

$$= \left[ \lim_{y \rightarrow 0} \log_a(1+y)^{\frac{1}{y}} \right]^{-1} = \left[ \log_a \underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{y}}}_{=e} \right]^{-1} = [\log_a e]^{-1}$$

$$= \frac{1}{\log_a e} = \frac{1}{\frac{\log_e e}{\log_e a}} = \frac{1}{\frac{1}{\log_e a}}$$

$$= \log_e a$$

$$= \ln a$$

$$6) \quad \boxed{\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1}$$

$$7) \quad \boxed{\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\log(1+u)}{u} = \log_a e}$$

$$* \lim_{u \rightarrow 0} \log_a(1+u)^{\frac{1}{u}} = \log_a \lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = \log_a e$$

$$8) \quad \boxed{\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1}$$



### Limites Notáveis

- 1)  $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$
- 2)  $\lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{1/u} = e$
- 3)  $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{u} = 1$
- 4)  $\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u = e$
- 5)  $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{a^u - 1}{u} = \ln a$
- 6)  $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$
- 7)  $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\log(1+u)}{u} = \log_a e$
- 8)  $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$


### 3.15- Assíntotas Horizontais e Verticais

Assíntotas são retas que tangenciam o gráfico de uma função, no infinito, e normalmente são paralelas aos eixos  $x$  e  $y$ . Estes próprios eixos podem ser assíntotas.

#### Assíntota Vertical

Dizemos que a reta  $x = a$  é uma assíntota vertical do gráfico de  $f$  se for verificada uma das seguintes condições:


- 1)  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$
- 2)  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$
- 3)  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$
- 4)  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$



### Assíntota Horizontal

Dizemos que a reta  $y = b$  é uma assíntota horizontal do gráfico de  $f$  se uma das condições abaixo for verificada:

- 1)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$
- 2)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$



$$y = f(x)$$

$$Df = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

$$x = a \text{ (A.V.)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$$

$$y = b \text{ (A.H.)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$$


$$y = c \text{ (A.H.)}$$

Assíntotas verticais envolvem limites infinitos, enquanto que assíntotas horizontais envolvem limites no infinito

### Exercícios

- 1) Determinar as assíntotas e fazer um gráfico de  $f(x) = \frac{1}{x-2}$ .

$$Df = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 2\}$$



$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$x = 2 \rightarrow \text{A.V.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-2} = 0$$


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x-2} = 0$$

$$y = 0 \rightarrow \text{A.H.}$$

$$2) f(x) = \sqrt{\frac{4x}{x-2}}$$

$$Df = \{x \in \mathbb{R} / \frac{4x}{x-2} \geq 0\}$$

$$Df = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 0 \text{ ou } x > 2\}$$



Para  $x = 0 \rightarrow y = 0$

$$y = \sqrt{\frac{4x}{x-2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{\frac{4x}{x-2}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{4x}{x-2}} = \sqrt{\frac{8}{0^+}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{\frac{4x}{x-2}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x}{x-2}} = \sqrt{4} = 2$$

$y = 2 \rightarrow \text{A.H.}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{4x}{x-2}} = 2$$

3) Dada a função  $f(x) = \frac{2x-6}{x-5}$ , achar as assíntotas.

4) Seja  $y = f(x) = \frac{4}{2x-3}$ . Achar as assíntotas.