

#### MITOS Y

### Doctorado en CIENÇIAS BIOMEDICAS

# REALIDADES

### DE LA LACTANCIA MATERNA





## Kealidad



¡No me bajó la leche!



Tamaño del estómago de un bebé en el primer mes de vida

La madre producirá la cantidad de leche que NECESITA su bebé en cada etapa de su crecimiento.


El calostro no nutre y es insuficiente.



El calostro es la leche con MAYOR CANTIDAD DE **NUTRIENTES.** Es normal que tarde en salir y que sea poca la cantidad.

Una muje<mark>r nec</mark>esita tomar leche para producirla y tomar atoles o cerveza para

aumentar la producción.





La producción de leche aumenta con la SUCCIÓN DEL BEBÉ, es decir con la frecuencia con que se amamanta.

Si la madre queda embarazada debe suspender la lactancia.





No hay ri<mark>esg</mark>o para lactar en el embarazo. Cuando el puede bebé nazca se amamantar a ambos hijos. A esta práctica se le llama LACTANCIA EN TÁNDEM.

El bebé llora porque tiene hambre, la leche materna es insuficiente.



El llanto del bebé puede muchos deberse a factores. Cuando llora por hambre se debe ofrecer el pecho A LIBRE DEMANDA.

Después de los 12 meses de edad del bebé la leche materna no aporta casi nada.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda prolongar la lactancia materna hasta **BIEN ENTRADO EL SEGUNDO AÑO** DE VIDA, ya que aporta el 40% de los requerimientos de energía del bebé.